

Dénomination du médicament

DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel
Calcipotriol/bétaméthasone
Applicateur

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ?
3. Comment utiliser DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : D05AX52

DAIVOBET est utilisé comme traitement topique du psoriasis du cuir chevelu chez les adultes et des plaques de psoriasis (psoriasis vulgaire) léger à modéré du reste du corps chez les adultes. Le psoriasis est dû à une production trop rapide des cellules de votre peau. Ceci entraîne

rougeur, desquamation et épaissement de la peau.

DAIVOBET contient du calcipotriol et de la bétaméthasone. Le calcipotriol aide à ramener la vitesse de croissance des cellules de la peau à la normale et la bétaméthasone agit en réduisant l'inflammation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ?

N'utilisez jamais DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel :

- si vous êtes allergique au calcipotriol, à la bétaméthasone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous avez des problèmes de taux de calcium dans l'organisme (demandez à votre médecin),
- si vous avez un psoriasis d'un certain type : comme le psoriasis érythrodermique, exfoliant ou pustuleux (demandez à votre médecin).

Comme DAIVOBET contient un corticoïde fort, ne PAS l'utiliser sur la peau atteinte de :

- infections de la peau dues à un virus (comme un bouton de fièvre ou la varicelle),
- infections de la peau dues à un champignon (pied d'athlète ou teigne),
- infections de la peau dues à une bactérie,
- infections de la peau dues à un parasite (comme la galle),
- tuberculose,
- dermatite périorale (rougeur autour de la bouche),
- amincissement de la peau, veines s'abîmant facilement, vergetures,
- ichtyose (peau sèche avec des sortes d'écailles),
- acné (boutons),
- rosacée (rougeur sévère soudaine ou rougeur de la peau du visage),
- ulcères ou plaies cutanées.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant et pendant l'utilisation de DAIVOBET :

- si vous prenez d'autres médicaments qui contiennent des corticoïdes car vous pourriez avoir des effets indésirables,
- si vous avez pris ce médicament pendant une longue période et prévoyez d'arrêter le traitement (car il y a un risque que votre psoriasis ne s'aggrave ou « flambe » quand les corticoïdes sont arrêtés brutalement),
- si vous avez du diabète (diabète sucré) car les taux de sucre/glucose dans le sang peuvent être modifiés par les corticoïdes,
- si votre peau s'infecte car vous pourriez avoir besoin d'arrêter le traitement,
- si vous avez un certain type de psoriasis appelé psoriasis en gouttes,
- en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Précautions particulières

- Evitez d'utiliser sur plus de 30% de votre corps ou d'utiliser plus de 15 grammes par jour.
- Evitez l'utilisation sous un bonnet de douche, des bandages ou pansements car cela augmente l'absorption des corticoïdes.
- Evitez l'utilisation sur de larges surfaces de peau lésée, sur les muqueuses ou dans les plis de la peau (aine, sous les bras, sous les seins) car cela augmente l'absorption des corticoïdes.
- Evitez l'utilisation sur le visage ou les organes génitaux (sexuels) car ceux-ci sont très sensibles aux corticoïdes.
- Evitez l'exposition excessive au soleil, l'utilisation excessive de cabines solaires ou autre forme de traitement par la lumière.

Enfants

DAIVOBET n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 18 ans.

Autres médicaments et DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

Si votre médecin est d'accord pour que vous allaitiez, faites attention et n'appliquez pas DAIVOBET sur vos seins.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament ne devrait avoir aucun effet sur votre capacité à conduire ou utiliser des machines.

DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel contient du butylhydroxytoluène (E321) et de l'huile de ricin.

DAIVOBET contient du butylhydroxytoluène (E321) et de l'huile de ricin qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : dermatite de contact, eczéma), ou une irritation des yeux et des muqueuses.

3. COMMENT UTILISER DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Comment appliquer DAIVOBET : voie cutanée.

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation qui se trouvent à la fin de cette notice avant d'utiliser l'applicateur de DAIVOBET.

Dans les instructions d'utilisation vous trouverez des informations à propos de l'assemblage, l'utilisation, le nettoyage et la conservation de l'applicateur de DAIVOBET.

Instruction pour une utilisation correcte

- Appliquez le produit uniquement sur le psoriasis et pas sur la peau qui n'a pas de psoriasis.
- **Agitez le flacon avant utilisation et retirez le bouchon.**
- **Mettez du gel sur un doigt propre ou directement sur les zones atteintes par le psoriasis.**
- Appliquez DAIVOBET sur la surface atteinte par le psoriasis avec **le bout du doigt l'applicateur** et faites-le pénétrer en frottant délicatement jusqu'à ce que cette zone soit couverte par une mince couche de gel.
- Ne pas couvrir la zone traitée ni avec un bandage, ni avec un pansement serré.
- Bien se laver les mains après avoir utilisé DAIVOBET **en cas de contact du gel sur les doigts**. Ceci évitera un transfert accidentel de gel sur d'autres parties du corps (surtout sur le visage, la bouche et les yeux).
- Ne vous inquiétez pas si vous appliquez sans le faire exprès du gel sur de la peau saine autour des lésions de psoriasis, mais essuyez-le s'il se répand trop largement.
- Pour un effet optimal, il est recommandé de ne pas prendre une douche ou un bain immédiatement après l'application de DAIVOBET.
- Après l'application du gel, évitez le contact avec des tissus qui sont facilement tachés par la graisse (comme la soie).

Il n'est pas nécessaire de se laver les cheveux avant l'application de DAIVOBET.

Pour un effet optimal, il est recommandé de ne pas se laver les cheveux immédiatement après l'application de DAIVOBET. Laissez DAIVOBET en contact avec le cuir chevelu pendant la nuit ou la journée. Lorsque vous laverez vos cheveux après l'application, suivez les

recommandations suivantes:

- 1 - Appliquez un shampoing doux sur cheveux secs, en particulier là où le gel a été appliqué.
- 2 - Laissez le shampoing sur le cuir chevelu pendant quelques minutes avant de rincer.
- 3 - Lavez-vous normalement les cheveux.

Il peut être nécessaire de répéter les étapes 1 à 3 une ou deux fois.

Si vous avez un psoriasis du cuir chevelu

- Avant d'appliquer DAIVOBET sur le cuir chevelu, commencez par coiffer vos cheveux pour éliminer les pellicules. Penchez la tête pour être sûr que DAIVOBET ne coule pas sur votre visage. Faire une raie peut faciliter l'application de DAIVOBET. Appliquez DAIVOBET sur la surface atteinte avec le bout du doigt et faites le pénétrer en frottant doucement.

Il n'est pas nécessaire de se laver les cheveux avant l'application de DAIVOBET.

- 1 - Agitez le flacon avant utilisation.
- 2 - Appliquez une goutte de DAIVOBET sur le bout du doigt.
- 3 - Appliquez directement sur les zones du cuir chevelu où vous pouvez sentir la plaque et massez DAIVOBET gel sur la peau. Selon la zone atteinte, 1 g à 4 g (l'équivalent d'une cuillère à café) est normalement suffisant.

Pour un effet optimal, il est recommandé de ne pas se laver les cheveux immédiatement après l'application de DAIVOBET. Laissez DAIVOBET en contact avec le cuir chevelu pendant la nuit ou la journée. Lorsque vous laverez vos cheveux après l'application, suivez les recommandations suivantes :

- 4 - Appliquez un shampoing doux sur cheveux secs, en particulier là où le gel a été appliqué.
- 5 - Laissez le shampoing sur le cuir chevelu pendant quelques minutes avant de rincer.
- 6 - Lavez-vous normalement les cheveux.

Il peut être nécessaire de répéter une ou deux fois les étapes 4 à 6.

Durée de traitement

- Utiliser le gel une fois par jour. Il peut être plus pratique d'appliquer le gel le soir.
- La période initiale normale de traitement est de 4 semaines pour le cuir chevelu et de 8 semaines en dehors du cuir chevelu.
- Votre médecin peut vous prescrire une durée de traitement différente.
- Votre médecin peut décider de répéter le traitement.
- Ne pas utiliser plus de 15 grammes par jour. Ainsi, un applicateur devrait durer au minimum 4 jours.
- Pour le traitement du cuir chevelu, une quantité entre 1 g et 4 g par jour est habituellement suffisante.

Si vous utilisez d'autres produits contenant du calcipotriol, la quantité totale de calcipotriol ne doit pas excéder 15 grammes par jour et la zone traitée ne devra pas dépasser 30 % de la surface totale du corps.

Que dois-je attendre de mon traitement par DAIVOBET ?

La plupart des patients voient un net résultat après 2 semaines même si le psoriasis n'a pas complètement disparu.

Si vous avez utilisé plus de DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel que vous n'auriez dû

Contactez votre médecin si vous avez utilisé plus de 15 grammes en un jour.

Une utilisation excessive de DAIVOBET peut provoquer des troubles du calcium sanguin qui revient généralement à la normale à l'arrêt du traitement.

Votre médecin peut avoir besoin de faire faire des analyses de sang pour vérifier que l'utilisation trop importante de gel n'a pas entraîné un trouble de votre calcium sanguin.

Une utilisation excessive au long cours peut aussi entraîner un fonctionnement anormal de vos glandes surrénales (elles se situent près du rein et produisent des hormones).

Si vous oubliez d'utiliser DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel

N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'appliquer.

Si vous arrêtez d'utiliser DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel

Le traitement par DAIVOBET doit être arrêté en suivant les instructions de votre médecin. Il peut être nécessaire d'interrompre le traitement graduellement, surtout si vous l'avez pris pendant longtemps.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables graves :

Contactez votre médecin ou votre infirmier/ère immédiatement ou le plus rapidement possible si l'une de ces réactions se produit. Vous pourriez avoir besoin d'interrompre votre traitement.

Les effets indésirables graves suivants ont été rapportés avec DAIVOBET :

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Aggravation de votre psoriasis. Si votre psoriasis s'aggrave, parlez-en à votre médecin le plus rapidement possible.

Certains effets indésirables graves sont provoqués par la bétaméthasone (un corticoïde fort), un des composants de DAIVOBET. Il faut informer votre médecin le plus rapidement possible si un effet indésirable grave se produit. Ces effets indésirables surviennent le plus souvent après une utilisation prolongée, dans les plis de la peau (aine, sous les bras, sous les seins), sous occlusion ou sur de larges surfaces de peau.

Ces effets sont notamment les suivants :

- Vos glandes surrénales peuvent cesser de fonctionner correctement. Les signes sont la fatigue, la dépression et l'anxiété.
- Cataracte (les signes sont vision floue et brouillée, difficulté à voir la nuit et sensibilité à la lumière) ou augmentation de la pression dans l'œil (les signes sont douleur de l'œil, œil rouge, baisse de la vision ou vision brouillée).

- Infections (car votre système immunitaire qui combat les infections peut être diminué ou affaibli).
- Psoriasis pustuleux (une zone rouge avec des pustules jaunâtres habituellement sur les mains ou les pieds). Si vous le remarquez, arrêtez de prendre DAIVOBET et parlez-en à votre médecin le plus rapidement possible.
- Impact sur le contrôle métabolique du diabète sucré (si vous êtes diabétique vous pouvez avoir des fluctuations de votre glycémie).

Certains effets indésirables graves sont provoqués par le calcipotriol :

- Réactions allergiques avec gonflement important du visage ou d'autres parties du corps comme les mains ou les pieds. Un gonflement des lèvres/gorge et des difficultés à respirer peuvent survenir. Si vous présentez une réaction allergique, arrêtez d'utiliser DAIVOBET, prévenez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.
- Le traitement avec ce gel peut faire augmenter le taux de calcium dans votre sang ou dans vos urines (en général lorsqu'une quantité excessive de gel a été utilisée). Les signes d'augmentation du calcium dans le sang sont une augmentation excessive de la quantité d'urine, une constipation, une faiblesse musculaire, une confusion et un coma. Ceci peut être grave et vous devez contacter votre médecin immédiatement. Cependant, à l'arrêt du traitement, le taux de calcium dans le sang redevient normal.

Effets secondaires moins graves :

Les effets indésirables suivants, moins graves, ont été rapportés avec DAIVOBET :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Démangeaisons.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Irritation des yeux,
- Sensation de brûlure de la peau,
- Douleur ou irritation cutanée,
- Inflammation ou gonflement des racines des poils (folliculite),
- Eruption cutanée avec inflammation de la peau (dermatite),
- Rougeur de la peau due à la dilatation des petits vaisseaux sanguins (érythème),
- Acné (boutons),
- Sécheresse de la peau,
- Eruption cutanée,

- Eruption cutanée pustuleuse,
- Infection de la peau.

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

- Réactions allergiques,
- Vergetures,
- Exfoliation de la peau,
- Effet rebond : aggravation des symptômes/du psoriasis après la fin du traitement.

Effets indésirables de fréquence indéterminée (la fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles) :

- Modification passagère de la coloration des cheveux blancs ou gris en une couleur jaunâtre, au niveau du site d'application du cuir chevelu,
- Vision floue.

Les effets indésirables moins graves provoqués par la bétaméthasone en particulier quand elle est utilisée pendant longtemps incluent notamment les effets suivants. Vous devez informer votre médecin dès que possible si vous les observez :

- Amincissement de la peau,
- Apparition de veines en surface ou de vergetures,
- Changement de la pousse des poils,
- Rougeur autour de la bouche (dermatite périorale),
- Eruption cutanée avec inflammation et gonflement (dermatite allergique de contact),
- Petits boutons de couleur dorée remplis de gel (colloïd milium),
- Eclaircissement de la peau (dépigmentation),
- Inflammation ou gonflement de la racine des poils (folliculite).

Les effets indésirables moins graves provoqués par le calcipotriol incluent :

- Sécheresse de la peau,
- Sensibilité de la peau à la lumière entraînant une éruption,

- Eczéma,
- Démangeaisons,
- Irritation de la peau,
- Sensation de brûlure et de picotement,
- Rougeur de la peau due à la dilatation des vaisseaux sanguins (érythème),
- Eruption cutanée,
- Eruption cutanée avec inflammation de la peau (dermatite),
- Aggravation du psoriasis.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon la cartouche après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne pas mettre au réfrigérateur.

A conserver dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Le flacon doit être jeté 6 mois après la première ouverture avec le gel qu'il contient.

L'applicateur est jetable. L'applicateur doit être jeté 6 mois après la première ouverture avec le gel qu'il contient.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel

- Les substances actives sont :

Calcipotriol..... 50 microgrammes
Sous forme de calcipotriol monohydrate
Bétaméthasone..... 0,5 mg
Sous forme de dipropionate de bétaméthasone
Pour 1 g de gel.

- Les autres composants sont :

Paraffine liquide, éther stéarylique de polyoxypropylène, huile de ricin hydrogénée, butylhydroxytoluène (E321), tout-rac-alpha-tocophérol.

Qu'est-ce que DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel et contenu de l'emballage extérieur

DAIVOBET est un gel presque transparent, incolore à très légèrement blanchâtre contenu dans un flacon (PEHD) muni d'un embout (PEBD) et d'un bouchon à vis en (PEHD). Les flacons sont placés dans des cartons.

Boîtes de : 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g et 3 x 60 g.

DAIVOBET est un gel presque transparent, incolore à très légèrement blanchâtre contenu dans une cartouche en polypropylène (avec un piston et un bouchon à vis en PEHD).

La cartouche et la tête de l'applicateur (revêtement extérieur en polypropylène, gâchette en polyoxyméthylène et embout applicateur en élastomère thermoplastique) sont assemblées avant la première utilisation.

Le capuchon de protection (en polypropylène) sert pour la conservation de DAIVOBET.

Cartouche(s), tête(s) de l'applicateur et capuchon(s) de protection sont placés dans un carton.

Boîtes de : 60 g (équivalent à 68 ml) et 2 x 60 g (équivalent à 2 x 68 ml).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

LEO PHARMA A/S
55 INDUSTRIPARKEN
2750 BALLERUP
DANEMARK

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES LEO
IMMEUBLE AMPÈRE E - LA DÉFENSE
34-40 RUE HENRI REGNAULT
92400 COURBEVOIE
FRANCE

Fabricant

LEO PHARMA A/S
55 INDUSTRIPARKEN

2750 BALLERUP
DANEMARK
OU
LEO LABORATORIES LTD. (LEO PHARMA)
285 CASHEL ROAD
DUBLIN
IRLANDE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Instructions d'utilisation de l'applicateur de DAIVOBET

Avant utilisation, veuillez lire attentivement l'intégralité de la notice ainsi que la rubrique Instructions d'utilisation, même si vous avez déjà utilisé DAIVOBET.

L'applicateur de DAIVOBET est conçu pour appliquer DAIVOBET sur votre peau et votre cuir chevelu atteints par des plaques de psoriasis. En utilisant l'applicateur de DAIVOBET, vous pouvez appliquer DAIVOBET sans en mettre sur vos doigts.

Toujours suivre les indications de votre médecin sur le traitement de votre psoriasis.

Ne donnez jamais DAIVOBET ou l'applicateur à d'autres personnes.

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Votre applicateur de DAIVOBET

Préparez votre applicateur de DAIVOBET

A. Vérifiez la date de péremption indiquée sur la cartouche.

Vérifiez la date de péremption indiquée sur l'étiquette de la cartouche.

Ne l'utilisez pas si elle est périmée.

La date de péremption sur la cartouche fait référence au dernier jour de ce mois.

Ecrivez sur l'étiquette de la cartouche la date à laquelle vous avez assemblé l'applicateur. N'utilisez pas l'applicateur plus de 6 mois après cette date.

B. Enlevez le bouchon de la cartouche

Tenez la cartouche droite et tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever.

Évitez de pencher la cartouche pour ne pas renverser de gel.

Jetez le bouchon après l'avoir enlevé.

C. Bien fixer la tête de l'applicateur

Tenez la cartouche droite et posez la tête de l'applicateur sur la cartouche.

Vissez la tête de l'applicateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle vous semble bien fixée.

Vous entendrez un « clic » une fois la tête bien fixée.

Note :

Ne pas démonter l'applicateur. Ceci pourrait le casser.

D. Avant la première utilisation, amorcez

Pour amorcer :

Assurez-vous que la tête de l'applicateur et la cartouche sont bien assemblées.

Enfoncez doucement le centre du piston et appuyez en même temps sur la gâchette jusqu'à voir du gel à l'extrémité de l'embout applicateur.

Si vous prenez l'avion avec votre applicateur de DAIVOBET assemblé, vous pourriez avoir besoin de réamorcer l'applicateur en appuyant plusieurs fois sur la gâchette avant de l'utiliser.

Appliquez DAIVOBET sur les zones atteintes par le psoriasis

E. Application sur les zones atteintes par le psoriasis

Mettez l'embout applicateur près de la zone atteinte par le psoriasis et appuyez sur la gâchette une ou plusieurs fois pour faire sortir DAIVOBET.

Lâchez complètement la gâchette entre chaque pression pour obtenir une dose entière.

Une pression complète délivre 0,05 g de DAIVOBET.

F. Utilisez les surfaces planes pour étaler DAIVOBET sur les plaques

Utilisez les surfaces planes pour faire pénétrer délicatement DAIVOBET à travers la peau lésée.

Faites attention à ne pas appuyer sur la gâchette pendant que vous étalez le gel.

G. Utilisation sur le cuir chevelu et à la racine des cheveux

Avant d'appliquer DAIVOBET sur le cuir chevelu, coiffez vos cheveux pour éliminer les pellicules.

Penchez la tête pour être sûr que DAIVOBET ne coule pas sur votre visage. Faire une raie peut faciliter l'application de DAIVOBET.

Localisez la surface à traiter avec les doigts et faites une raie.

Utilisez directement l'embout applicateur sur le cuir chevelu pour déposer et faire pénétrer DAIVOBET.

H. Après application de DAIVOBET

Assurez-vous que les zones atteintes par le psoriasis sont suffisamment recouvertes.

Si nécessaire, demandez à quelqu'un de vous aider à appliquer DAIVOBET sur les zones que vous ne pouvez pas atteindre ou voir.

Lavez-vous les mains après l'application, si vous, ou la personne qui vous a aidé(e) avez du gel sur les doigts.

Ceci évitera un transfert accidentel de gel sur les autres parties de votre corps (surtout sur le visage, la bouche et les yeux).

Après utilisation de l'applicateur

I. Nettoyez votre applicateur de DAIVOBET après chaque utilisation

Juste après l'utilisation de l'applicateur, essuyez la tête de l'applicateur à l'aide un mouchoir propre et sec.

Évitez d'appuyer sur la gâchette pendant que vous nettoyez la tête de l'applicateur.

Note :

Ne pas nettoyer l'applicateur avec de l'eau, des détergents ou d'autres substances.

Ne pas utiliser des chiffons humides ou mouillés pour essuyer l'applicateur.

J. Remettez le capuchon de protection

Remettez le capuchon de protection après chaque utilisation pour que la tête de l'applicateur reste propre.

Pour la conservation et le transport de DAIVOBET, assurez-vous toujours que le capuchon de protection est bien en place pour éviter que DAIVOBET ne coule.

K. Estimez la quantité de DAIVOBET restante

Pour estimer la quantité de DAIVOBET restante, regardez en dessous de la cartouche pour voir la position du piston. Le piston monte au fur et à mesure que le gel est utilisé.

Avant réutilisation de l'applicateur

L. Vérifiez la date de péremption

Avant d'utiliser l'applicateur, vérifiez toujours la date de péremption indiquée sur l'étiquette de la cartouche.

Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée ou si 6 mois se sont écoulés depuis l'ouverture de la cartouche.

La date de péremption sur la cartouche fait référence au dernier jour de ce mois.

M. Enlevez le capuchon de protection

Enlevez le capuchon de protection en poussant la languette située à l'arrière.

Conservation

Assurez-vous toujours que le capuchon de protection est bien en place pour éviter que DAIVOBET ne coule pendant la conservation et le transport.

Voir rubrique 5 « Comment conserver DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ? » pour plus d'informations sur les conditions de conservation.

Elimination

Voir rubrique 5 « Comment conserver DAIVOBET 50 microgrammes/0,5 mg/g, gel ? »
pour des informations sur l'élimination.