

Dénomination du médicament

MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade
Mupirocine

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ?
3. Comment utiliser MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est une pommade contenant un antibiotique: la mupirocine. Elle permet de combattre les infections dues aux bactéries.

Ce médicament est utilisé pour traiter des infections de la peau dues à certaines bactéries (les staphylocoques et les streptocoques) et sur lesquelles la substance active (la mupirocine) a un effet.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ?

N'utilisez jamais MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade

- si vous êtes allergique à la mupirocine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Pour traiter une infection des seins si vous allaitez.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade.

- Avant d'utiliser ce médicament, vous devez prévenir votre médecin si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale).
- N'appliquez pas cette pommade :
 - o sur les yeux,
 - o à l'intérieur du nez,
 - o sur une grande surface ou de manière prolongée sans l'avis de votre médecin.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade

Vous devez éviter d'utiliser en même temps ou successivement d'autres pommades.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Ce médicament peut être utilisé au cours de l'allaitement.

N'utilisez jamais MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade pour traiter une infection des seins si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade contient du polyoxyéthylène glycol 400 et du polyoxyéthylène glycol 3350.

3. COMMENT UTILISER MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 2 à 3 applications par jour d'une petite quantité de pommade.

- Ce médicament est réservé à l'usage local, il s'applique sur la peau.
- Après application de la pommade, vous pouvez recouvrir la zone traitée avec une gaze stérile ou avec un pansement imperméable à l'eau et à l'air (pansement occlusif).
- La pommade est sans odeur, s'enlève à l'eau et ne tache pas les habits.

La durée du traitement est en règle générale de 5 à 10 jours.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de tout symptôme ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

Si vous avez utilisé plus de MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade que vous n'auriez dû
Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade
Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade
Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Une allergie. Vous pourrez reconnaître une allergie par l'apparition de boutons, d'urticaire (éruptions de la peau ressemblant à une piqûre d'ortie), d'un brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner des difficultés à respirer. Si l'un de ces effets apparaît, vous devez immédiatement arrêter le traitement et contacter votre médecin.
- Des picotements et des brûlures à l'endroit où vous avez appliqué MUPIDERM.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette

notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MUPIROCINE BIOGARAN 2 %, pommade ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube, la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver le tube entamé au-delà de 6 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade ?

- La substance active est :

Mupirocine..... 2 g
Pour 100 g.

- Les autres composants sont :

Polyoxyéthylèneglycol 400, polyoxyéthylèneglycol 3350.

Qu'est-ce que MUPIROCINE BIOGARAN 2%, pommade et contenu de l'emballage extérieur

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOUCHARA-RECORDATI
TOUR HEKLA
52 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
92800 PUTEAUX

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

BIOGARAN
15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
92700 COLOMBES

Fabricant

LABORATOIRE CHEMINEAU

93 ROUTE DE MONNAIE

37210 VOUVRAY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Conseil d'éducation sanitaire :

QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,

- les moments de prise,

- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2- Respectez strictement votre ordonnance.

3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.