

Dénomination du médicament

**PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale**  
**Estriol**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ?
3. Comment utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique - Estrogène naturel - Traitement hormonal substitutif des carences estrogéniques ; code ATC : G: Système génito-urinaire et hormones sexuelles  
PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale appartient à un groupe de médicaments appelés traitement hormonal substitutif (THS). Il contient de l'estriol, une hormone féminine (un estrogène).

Ce médicament est préconisé dans les affections de la vulve et du vagin liées à la ménopause (naturelle ou chirurgicale).

PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale est utilisé surtout chez les femmes ménopausées au moins 12 mois après leur dernière menstruation naturelle.

Il est utilisé pour soulager les symptômes de la ménopause au niveau vaginal tels que la sécheresse vaginale ou l'irritation vaginale. On parle « d'atrophie vaginale ». Elle est causée par une baisse du taux d'œstrogènes dans votre corps : ceci arrive naturellement après la ménopause.

PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale agit en remplaçant les œstrogènes qui sont normalement produits par les ovaires de la femme. Il s'insère dans le vagin, pour que l'hormone soit libérée là où elle est nécessaire. Ceci peut soulager l'inconfort vaginal.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ?**

### **Antécédents médicaux et contrôles réguliers**

L'utilisation d'un THS entraîne des risques qui doivent être considérés avant de décider de commencer ou de poursuivre ce type de traitement.

L'expérience dans les traitements des femmes en ménopause précoce (due à une insuffisance ovarienne ou une chirurgie) est limitée. Si vous êtes en ménopause précoce, les risques d'utiliser des THS peuvent être différents. Veuillez en parler à votre médecin.

Avant de commencer (ou de recommencer) un THS, votre médecin vous interrogera sur vos propres antécédents médicaux et ceux de votre famille. Votre médecin peut décider de procéder à un examen physique. Cela peut inclure un examen de vos seins et/ou un examen gynécologique, le cas échéant.

Une fois que vous avez commencé le traitement par PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale, vous devriez consulter votre médecin pour des contrôles réguliers (au moins une fois par an). Lors de ces contrôles, discutez avec votre médecin des bénéfices et des risques de continuer le traitement par PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale.

N'oubliez pas les mammographies régulières, comme votre médecin vous les aura recommandées.

### **N'utilisez jamais PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale**

Si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Si vous avez un doute concernant l'un des points ci-dessous, consultez votre médecin avant d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale.

N'utilisez jamais PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale :

- si vous avez ou avez eu un cancer du sein, ou si vous pourriez en avoir un ;
- si vous avez un cancer sensible aux œstrogènes, comme un cancer de la muqueuse utérine (endomètre), ou si vous pourriez en avoir un ;
- si vous avez des saignements vaginaux inexplicables ;

- si vous avez un épaississement excessif de la muqueuse utérine (hyperplasie de l'endomètre) non traité ;
- si vous avez ou avez eu un caillot de sang dans une veine (thrombose) par exemple, des jambes (thrombose veineuse profonde) ou des poumons (embolie pulmonaire) ;
- si vous avez un trouble de la coagulation du sang (tel un déficit en protéine C, en protéine S, ou en antithrombine) ;
- si vous avez ou avez eu récemment une maladie causée par des caillots de sang dans des artères, comme une crise cardiaque, un AVC ou une angine de poitrine ;
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie et si vos analyses de la fonction hépatique ne sont pas dans les normes ;
- si vous avez un rare problème de sang appelé « porphyrie » qui est transmis dans les familles (hérédité) ;
- si vous êtes allergique à l'estriol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous êtes enceinte ou allaitez.
- si l'une des conditions ci-dessus apparaît pour la première fois lors de l'utilisation de PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale, n'en utilisez plus et consultez votre médecin immédiatement.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale.

Prévenez votre médecin si vous avez déjà eu l'un des problèmes suivants, avant de commencer le traitement, car ceux-ci peuvent revenir ou s'aggraver au cours du traitement par PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale. Dans ce cas, vous devriez consulter votre médecin plus souvent pour des contrôles :

- fibromes dans l'utérus.
- croissance de la muqueuse utérine en dehors de votre utérus (endométriose) ou des antécédents de croissance excessive de la muqueuse utérine (hyperplasie de l'endomètre).
- risque accru de développer des caillots sanguins (voir rubrique 2 « Caillots sanguins veineux (thrombose) »).
- risque accru de contracter un cancer sensible aux œstrogènes (comme avoir une mère, une sœur ou grand-mère qui a eu un cancer du sein).
- hypertension artérielle.

- un trouble du foie, par exemple une tumeur bénigne du foie.
- diabète.
- calculs biliaires.
- migraine ou maux de tête sévères.
- une maladie du système immunitaire qui affecte de nombreux organes du corps (lupus érythémateux disséminé, LED).
- épilepsie.
- asthme.
- une maladie du tympan et de l'audition (otospongiose).
- la rétention d'eau en raison de problèmes cardiaques ou rénaux.
- angio?dème héréditaire ou acquis.

Cessez d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale et consultez votre médecin immédiatement

Si vous remarquez un des éléments suivants lors de la prise de THS :

- L'une des conditions mentionnées dans la rubrique « N'UTILISEZ JAMAIS PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ».
- Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse). Ceci peut être un signe de maladie du foie.
- Un gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge, et/ou des difficultés à déglutir ou une urticaire accompagnée de difficultés à respirer qui suggèrent un angio?dème.
- Une forte augmentation de la pression artérielle (les symptômes peuvent être des maux de tête, de la fatigue, des vertiges).
- Des maux de tête de type migraineux qui se produisent pour la première fois.
- Si vous tombez enceinte.
- Si vous remarquez des signes de caillot de sang, tels que :
  - gonflement douloureux et rougeur des jambes ;
  - douleur soudaine à la poitrine ;
  - difficulté à respirer.

Pour plus d'informations, voir « Caillots de sang dans une veine (thrombose) ».

Remarque : PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale n'est pas un contraceptif. Si moins de 12 mois se sont écoulés depuis votre dernière menstruation ou si vous avez moins de 50 ans, il se peut que vous deviez toujours utiliser une méthode contraceptive supplémentaire pour prévenir une grossesse. Parlez-en à votre médecin pour obtenir des conseils.

### **THS et cancer**

#### **Epaississement excessif de la muqueuse utérine (hyperplasie de l'endomètre) et cancer de la muqueuse utérine (cancer de l'endomètre)**

La prise de comprimés d'un THS uniquement à base d'œstrogènes pendant une longue période peut augmenter le risque de développer un cancer de la muqueuse de l'utérus (l'endomètre).

Il est possible qu'il y ait un risque similaire lorsque PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale est utilisé dans le cadre de traitements répétés ou à long terme (plus d'un an).

Cependant, il a été démontré que l'absorption de PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale dans le sang est très faible ; par conséquent, l'ajout d'un progestatif ne semble pas nécessaire.

L'apparition de saignements ou de légères pertes de sang (« spotting ») n'a généralement rien d'inquiétant, mais vous devez consulter votre médecin. C'est peut-être un signe d'épaississement de votre endomètre.

Les risques ci-après s'appliquent aux médicaments de traitement hormonal substitutif (THS) qui circulent dans le sang. Toutefois, PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT est destiné au traitement local au niveau du vagin et son absorption dans le sang est très faible. Il est peu probable que les conditions indiquées ci-dessous s'aggravent ou récidivent lors du traitement par PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, mais il convient de consulter un médecin si vous êtes concernée.

#### **Cancer du sein**

Les données disponibles suggèrent que l'utilisation de PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT n'augmente pas le risque de cancer du sein chez les femmes n'ayant pas été atteinte d'un cancer du sein par le passé. Il n'a pas été établi si PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT peut être utilisé en toute sécurité chez les femmes ayant été atteintes d'un cancer du sein par le passé.

#### **Contrôlez régulièrement vos seins. Consultez votre médecin si vous remarquez des changements tels que :**

- capitonnage de la peau ;
- changements au niveau du mamelon ;
- tout nodule que vous pouvez voir ou sentir.

De plus, vous êtes invité à vous joindre aux programmes de dépistage de mammographie lorsqu'ils vous sont offerts.

#### **Cancer de l'ovaire**

Le cancer de l'ovaire est rare - beaucoup plus rare que le cancer du sein. L'utilisation d'un THS par œstrogènes seuls a été associée à une légère augmentation du risque de cancer ovarien.

Le risque de cancer ovarien varie en fonction de l'âge. Par exemple, chez les femmes âgées entre 50 et 54 ans qui ne prennent pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez environ 2 femmes sur 2000 en moyenne sur une période de 5 ans. Chez les femmes ayant pris un THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas sur 2000 utilisatrices (c'est-à-dire soit environ 1 cas de plus).

#### **Effets des THS sur le cœur et la circulation**

##### **Caillots sanguins veineux (thrombose)**

Le risque de caillots sanguins veineux est 1,3 à 3 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes n'en prenant pas, surtout pendant la première année de prise.

Les caillots sanguins peuvent être graves, s'ils se dirigent vers les poumons ils peuvent causer des douleurs thoraciques, des essoufflements, des évanouissements et même la mort.

Vous êtes plus susceptible d'avoir des caillots sanguins veineux en vieillissant et si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Informez votre médecin si vous êtes concerné par une des situations suivantes :

- vous êtes incapable de marcher pendant longtemps en raison d'une chirurgie majeure, d'une blessure ou d'une maladie (voir aussi rubrique 3 « Si vous avez besoin de vous faire opérer ») ;
- si vous avez un surpoids sérieux (IMC >30 kg/m<sup>2</sup>) ;
- si vous avez un problème de coagulation du sang qui nécessite un traitement à long terme avec un médicament utilisé pour prévenir les caillots sanguins ;
- si l'un de vos proches a déjà eu un caillot sanguin dans la jambe, le poumon ou un autre organe ;
- vous avez un lupus érythémateux disséminé (LED) ;
- vous avez un cancer.

Pour connaître les symptômes d'un caillot sanguin, voir rubrique « Cessez d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale et consultez votre médecin immédiatement ».

### Comparaison

Chez les femmes de la cinquantaine qui ne prennent pas de THS, pendant plus de 5 ans, entre 4 et 7 femmes sur 1000, en moyenne, seraient susceptibles d'avoir un caillot sanguin veineux.

Chez les femmes qui prennent un THS ?strogénique, pendant plus de 5 ans, entre 5 et 8 femmes sur 1000, seraient susceptibles d'avoir un caillot sanguin veineux (c'est-à-dire 1 cas de plus).

On ne sait pas si le risque pour PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale est le même que pour d'autres THS.

#### **Les maladies du cœur (crise cardiaque)**

Pour les femmes qui prennent un traitement ?strogénique, il n'y a pas d'augmentation de risque de développer une maladie cardiaque.

#### **AVC**

Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois supérieur chez les femmes prenant un THS que chez les femmes n'en prenant pas. Le nombre de cas supplémentaires d'AVC dû à une utilisation de THS augmente avec l'âge.

### Comparaison

Chez les femmes de la cinquantaine qui ne prennent pas de THS, on s'attend à ce que 8 femmes sur 1000 en moyenne, soient susceptibles d'avoir un AVC au cours d'une période de 5 ans. Chez les femmes de la cinquantaine, qui prennent un THS, il y aura 11 cas sur 1000 femmes, sur plus de 5 ans (c'est-à-dire 3 cas de plus).

## **Autres conditions**

- Les THS ne préviennent pas les pertes de mémoire. Il existe certaines preuves d'un risque plus élevé de pertes de mémoire chez les femmes qui commencent à utiliser un THS après l'âge de 65 ans. Parlez-en avec votre médecin pour obtenir des conseils.
- Informez votre médecin si vous êtes atteinte de l'hépatite C et vous prenez le schéma thérapeutique combiné ombitasvir hydraté/paritaprévir hydraté/ritonavir avec ou sans dasabuvir. L'administration de cette combinaison de médicaments avec certains produits contenant de l'œstrogène pourrait causer une hausse des résultats sanguins de la fonction hépatique (augmentation du taux de l'enzyme hépatique ALAT). Le risque de cet événement avec PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale est actuellement inconnu.

## **Enfants**

Sans objet.

## **Autres médicaments et PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent interférer avec l'effet de PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ou PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale peut interférer avec l'effet d'autres médicaments. Cela pourrait conduire à des saignements irréguliers. Cela vaut pour les médicaments suivants :

- Médicaments pour l'épilepsie (comme le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine).
- Les médicaments contre la tuberculose (tels que la rifampicine, rifabutine).
- Médicaments contre une infection au VIH (tels que la névirapine, l'éfavirenz, le ritonavir et le nelfinavir).
- Les médicaments à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*).
- Informez votre médecin si vous êtes atteinte de l'hépatite C et vous prenez le schéma thérapeutique combiné ombitasvir hydraté/paritaprévir hydraté/ritonavir avec ou sans dasabuvir. L'administration de cette combinaison de médicaments avec certains produits contenant de l'œstrogène pourrait causer une hausse des résultats sanguins de la fonction hépatique (augmentation du taux de l'enzyme hépatique ALAT). Le risque de cet événement avec PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale est actuellement inconnu.

## **Analyses de laboratoire**

Si vous devez faire une analyse sanguine, prévenez votre médecin ou le personnel du laboratoire que vous utilisez PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale, car ce médicament peut modifier les résultats de certaines analyses

## **PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale avec des aliments et boissons**

Sans objet.

## **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale est destiné à être utilisé chez les femmes ménopausées seulement. Si vous devenez enceinte, arrêtez de prendre PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale et contactez immédiatement votre médecin.

La grossesse ne représente pas une indication de ce médicament. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, interrompez le traitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale contient de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique**

Ce médicament contient de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

## **3. COMMENT UTILISER PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ?**

### Mode d'administration

La crème doit être appliquée le soir au coucher dans le vagin.

Un applicateur marqué d'un trait rouge permet l'application de 0,5 g de crème (soit 0,5 mg d'estriol). Cet applicateur doit être lavé à l'eau après chaque application.

1. Retirez le bouchon du tube, inversez-le et utilisez la pointe acérée pour ouvrir le tube.
2. Visser l'extrémité de l'applicateur sur le tube. Assurez-vous que le piston est complètement inséré dans le tube.
3. Presser le tube lentement pour remplir l'applicateur de crème jusqu'à ce que le piston s'arrête (à la bague rouge, voir les flèches dans l'illustration ci-dessous).
4. Dévissez l'applicateur du tube et remettez le bouchon sur le tube.
5. Pour appliquer la crème, allongez-vous et insérez l'extrémité de l'applicateur profondément dans le vagin.
6. Poussez lentement le piston à fond pour vider l'applicateur.
7. Après utilisation, retirez le piston du tube au-delà du point de résistance et lavez-le dans de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de détergent. Rincez bien. **NE METTEZ PAS L'APPLICATEUR DANS DE L'EAU TRES CHAUDE OU BOUILLANTE.**
8. L'applicateur peut être réassemblé en insérant le piston à fond dans le cylindre au-delà du point de résistance.

Jeter l'applicateur une fois que le tube est vide.

### Posologie

Une application de crème jusqu'à régression des symptômes en moyenne au bout de trois semaines (maximum 4 semaines) suivie d'un traitement d'entretien d'une application de crème deux jours par semaine.

La posologie doit être adaptée selon l'amélioration obtenue.

Des cures d'entretien peuvent être nécessaires.

**DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.** Votre médecin vous prescrira la dose la plus faible suffisante pour traiter vos symptômes pendant une période aussi courte que nécessaire. Informez votre médecin si vous pensez que la dose est trop élevée ou trop faible.

Si vous avez besoin de vous faire opérer



Si vous allez subir une intervention chirurgicale, dites au chirurgien que vous prenez PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale. Vous devrez peut-être arrêter le traitement 4 à 6 semaines avant l'opération afin d'éviter l'apparition de caillots sanguins (voir rubrique 2 « Caillots sanguins veineux (thrombose)»). Demandez à votre médecin avant de recommencer le traitement par PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale.

**Si vous avez utilisé plus de PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale que vous n'auriez dû**

Dans le cas d'un surdosage aigu, des nausées, vomissements et saignements génitaux chez la femme peuvent survenir. Si vous avez pris plus de PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale qu'il ne fallait, contactez votre médecin.

**Si vous oubliez d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez oublié d'utiliser la crème vaginale, utilisez-la dès que vous vous en souvenez, sauf si vous avez plus de douze heures de retard. Si vous avez plus de douze heures de retard, ne prenez pas la dose oubliée et prenez simplement la dose suivante comme d'habitude.

**Si vous arrêtez d'utiliser PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les maladies suivantes sont signalées plus souvent chez les femmes utilisatrices de THS, qui circulent dans le sang, que chez les femmes non utilisatrices de THS. Ces risques s'appliquent moins aux traitements administrés par voie vaginale tels que PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale :

- cancer des ovaires.
- caillots sanguins dans les veines des jambes ou dans les poumons (thromboembolie veineuse).
- AVC.
- pertes de mémoire probables si le THS est commencé après 65 ans.

Pour plus d'informations sur ces effets indésirables, voir la rubrique 2.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Localement, une irritation ou des démangeaisons surtout en début de traitement.
- Des douleurs des seins surtout en début de traitement.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec d'autres THS :

- maladie de la vésicule biliaire.
- diverses affections de la peau :
  - décoloration de la peau en particulier du visage ou du cou connu sous le nom des « masque de grossesse » (chloasma).
  - nodules cutanés rougeâtres douloureux (érythème noueux).
  - éruption cutanée avec rougeurs ou plaies en forme de cible (érythème polymorphe).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C. Ne pas congeler.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale**

- La substance active est :

Estriol..... 0,10 g pour 100 g de crème vaginale

- Les autres composants sont :

Eutanol G, palmitate de cétyle, glycérol, alcool cétylique, alcool stéarylique, polysorbate 60, acide lactique, stéarate de sorbitan, chlorhydrate de chlorhexidine, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

### **Qu'est-ce que PHYSIOGINE 0,1 POUR CENT, crème vaginale et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous la forme d'une crème vaginale.

Tube de 15 g avec applicateur.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

Aspen Pharma Trading Limited  
3016 Lake Drive  
Citywest Business Campus  
Dublin 24  
Irlande

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**ASPEN FRANCE**  
21 AVENUE EDOUARD BELIN  
92500 RUEIL MALMAISON

### **Fabricant**

ASPEN BAD OLDESLOE GMBH  
INDUSTRIESTRASSE 32-36  
D-23843 BAD OLDESLOE  
ALLEMAGNE

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).